

ยาถ่ายพยาธิ



ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

| ตัวยา | พยาธิ | | | | คำเตือน | |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|----------------------|---|
| | ตัวกลม | ใบไม้ | ตัวแบน | สตรองจิลอยด์ | สตรีมีครรภ์ให้นมบุตร | บุคคลทั่วไป |
| Albendazole | ✓ | ✓ | ✓ | | X | ผู้ที่มีประวัติการชักหรือเป็นโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา |
| Mebendazole | ✓ | | ✓ | | X | ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้ที่เป็นโรคตับ |
| Niclosamide | | | ✓ | | | เคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืน ให้กินยาตอนท้องว่าง หลังจากกินยาแล้ว 2 ชั่วโมง ให้กินยาระบายตาม |
| Praziquantel | | ✓ | ✓ | | X | ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี |
| Ivermectin | | | | ✓ | X | ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรปรึกษาแพทย์หากใช้ยานี้พร้อมกับยาวัณโรค |

ผลข้างเคียงของยาถ่ายพยาธิ



ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ



ปวดมวนท้อง



คลื่นไส้ อาเจียน

การรักษาจะใช้ขนาดและระยะเวลาในการกินยาแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของพยาธิ
ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนกินยาทุกครั้ง